

## تناول الدواء عن طريق التغذية الكاملة بالحقن باستخدام كيس به تجويف ثنائي

### الإجراءات:

1. إذا كان الكيس مبردًا، فأزل كيس التغذية الكاملة بالحقن للسماح بتدفقته ليناسب درجة حرارة الغرفة لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات.
2. التحقق من تسمية الدواء والمادة الفعالة وعدد مرات تناوله وصلاحيته. التحقق من كيس التغذية الكاملة بالحقن والتحقق من التجويف الأسفل بكيس التغذية الكاملة بالحقن للعثور على أي فتحات وتسربات ومادة معينة وصفاء الدواء. تواصل مع Chartwell في حالة وجود أي تعارضات أو استفسارات.
3. جمع التجهيزات. تنظيف منطقة العمل. غسل الأيدي بشكل كامل، لمدة 20 ثانية على الأقل.
4. ضع الكيس مسطحًا على الطاولة واسحب الشريط المرن. أزل الشريط المرن وتخلص منه.
5. أدر الكيس. أزل القضيب الصلب وتخلص منه.
6. اضغط التجويف الأسفل برفق. حرك الكيس لخلط المحاليل بقوة.
7. اسحب غطاء مدخل المجموعة المتصل باللسان وأزل غطاء مدخل المجموعة. صل مجموعة تناول الدواء حسب التعليمات.
8. صل مجموعة تناول الدواء عن طريق التغذية الكاملة بالحقن (الأنبوب) لمضخة الحقن حسب التعليمات.
9. تناول الدواء عن طريق التغذية الكاملة بالحقن حسب التعليمات.